



Guía de Prevención de Enfermedades Aviares Para Plantas de Alimento

Prevención de enfermedades aviares significa todo lo que usted pueda hacer para proteger a sus aves contra las enfermedades que son fácilmente diseminadas cuando aves contaminadas, personas y materiales de los corrales son trasladados de un lugar a otro. **En otras palabras, cuando se trasladan aves contaminadas, las enfermedades se mueven con ellas también.** Sin embargo, si usted sigue los siguientes pasos básicos y los aplica diariamente, usted puede reducir enormemente el riesgo de contaminar con gérmenes a sus aves.

Choferes de Entrega

- Los tapetes sanitarios deben colocarse por donde los choferes entren y salgan.
- Las llantas y los chasis de los camiones de reparto deben lavarse a presión y desinfectarse antes de entrar y salir de las instalaciones avícolas comerciales.
- Los choferes de reparto deben tener juegos de overoles, cubre-botas de plástico, guantes de latex, y cubrepelo, (equipo personal de protección o EPP) para usarse antes de entrar a cada instalación avícola comercial.
- Los choferes deben minimizar el tiempo de permanencia afuera de los vehículos cuando estén en las instalaciones, y su acceso debe limitarse únicamente a los lugares necesarios para realizar su trabajo.
- Los choferes deben permanecer en el vehículo todo el tiempo, excepto para las maniobras necesarias en los silos durante la entrega de alimento. Si es posible un empleado del rancho

- debe subirse a los silos para ayudar al chofer.
- Antes de salir de las instalaciones es importante recoger todo el equipo personal de protección y ponerlo en una bolsa para que sea lavado o eliminado (si es desechable) posteriormente y desinfectar la cabina del vehículo.

Trabajadores de la Planta de Alimentos

- Antes de entrar al área de trabajo, póngase ropa de trabajo limpia, lave y desinfecte sus manos, y limpie y desinfecte su calzado
- No vaya de una área sucia a una área limpia
- El calzado debe limpiarse con un cepillo usando jabón y agua, y desinfectarse usando un tapete sanitario con alfombra-cepillo de plástico.

Supervisión

- El personal gerencial responsable de la producción de alimento y transporte, son los responsables de supervisar y de asegurar el cumplimiento del programa de prevención de enfermedades establecido.
- Las llantas y chasis de todos los vehículos que entren y salgan de las instalaciones de la planta, deben ser lavadas a presión y desinfectadas.
- Las fábricas que entreguen alimento a granjas con bioseguridad inadecuada, deben interrumpir la entrega de alimento hasta que implementen una bioseguridad adecuada.

- Las fábricas no deben aceptar el retorno de tarimas o bolsas de alimento rotas.
- Cada fábrica debe tener a la vista las políticas para visitantes claramente
- Mantenga un libro de registro a la entrada de las instalaciones.
- El acceso a las áreas de procesamiento y manejo del alimento, debe ser estrictamente limitado a las personas esenciales para la operación de la fábrica.
- Las fábricas que permiten a sus clientes minoristas o mayoristas cargar su alimento, no deben permitir a los choferes salir de sus vehículos; las llantas y los chasis de los vehículos deben ser lavados y desinfectados antes de entrar a las instalaciones de la fábrica. Si los clientes tienen que salir de sus vehículos, deben desinfectar sus zapatos.

Desinfectantes y Tapetes Sanitarios

- Prepare los desinfectantes regularmente y cámbielos cuando estén sucios.
- Limpie perfectamente y cepille los objetos antes de aplicar el desinfectante.
- Aplique los desinfectantes usando cepillos, esponjas o atomizadores. Permita que el desinfectante actúe por el tiempo adecuado (de acuerdo a las instrucciones del fabricante).
- Lea cuidadosamente y siga las instrucciones del fabricante y tome todas las precauciones.

Desinfectantes en los tapetes sanitarios

- Prepare la solución desinfectante y cámbiela cuando este sucia.
- Limpie cuidadosamente con un cepillo todos los utensilios antes de aplicar el desinfectante.
- Aplique el desinfectante usando un cepillo, esponja, atomizador o tapete sanitario. Permita al desinfectante actuar el tiempo adecuado (de acuerdo a las instrucciones de fabricante).

- Lea y siga las instrucciones del fabricante y tome todas las precauciones necesarias.
- El desinfectante sucio debe eliminarse de acuerdo a las regulaciones locales.

Ejemplos de Desinfectantes

1. Roccal®: Mezclar ½ oz. Liquidas de Roccal® por galón de agua.
2. Nolvasan® (chlorohexidine diacetate 2%): Mezclar 3 oz. liquidas de Nolvasan® por galón de agua.
3. Cloro® (hipoclorito de sodio 6%): Mezclar ¾ tazas de cloro por galón de agua.
4. Lysol® aerosol (para desinfección de zapatos)
5. Purell® (para desinfección de manos)

Limitación de responsabilidades: Los nombres comerciales usados en esta publicación no constituyen garantía o recomendación de estos productos. El programa de Salud Avícola no se responsabiliza por los resultados del uso de los productos descritos anteriormente. Igualmente, los procedimientos mencionados no asegura la prevención de enfermedades altamente infecciosas que afecten a sus aves; sin embargo estos podrían reducir el riesgo.

Reporte las aves enfermas llamando al:

1-800-491-1899

o al

1-909-947-4462